

ANEXOS

| Síntomas de la onfalitis. |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Olor desagradable. • Secreciones purulentas o turbias. • Eritema. • Edema. • Fiebre. |

Tabla 1. Síntomas de la onfalitis en el recién nacido.

| <i>Antiséptico</i> | <i>Espectro de acción</i> | <i>Inicio de actividad</i> | <i>Efecto residual</i> | <i>Acción ante materia orgánica : sangre</i> | <i>Seguridad</i> | <i>Toxicidad</i> | <i>Contraindicaciones</i> |
|--------------------|---|----------------------------|------------------------|--|--|---|--|
| Alcohol 70° | Gram + Gram – Virus: VIH, Citomegalovirus | 2 min | Nulo | Inactivo | Inflamable | Irritante | Heridas abiertas |
| Clorhexidina | Gram + Gram – (pseudomonas) Esporas Hongos Virus | 15-35 sg | 6H | Activo | Si > 4% Daño tisular | No tóxico | No se han descrito |
| Povidona Yodada | Gram + Gram – Hongos Virus | 3 min | 3H | Inactivo | Retrasa el crecimiento del tejido de granulación | Irritación cutánea. Absorción sistemática. | Embarazo. Neonatos. Lactantes. Alteraciones del tiroides. |

Tabla 2. Tipos de antisépticos y sus características.